نام ژنریک : بیزوپرلول

نام تجاری: کونکور

مکانیسم دارو : کنترل کننده فشارخون

بیزوپرولول

- خستگی، ضربان قلب آرام، اسهال و سرگیجه ممکن است اتفاق بیفتد. اگر هر کدام از این عوارض ایجاد شد و یا بدتر شد بلافاصله به پزشک اطلاع دهید. برای کاهش ریسک ابتلا به سرگیجه خیلی آرام از حالت خوابیده یا نشسته بلند شوید.
- این دارو ممکن است جریان خون دست و پا را کاهش دهد، برای همین احساس سرما در این قسمت ها ایجاد می شود. سیگار کشیدن این حس را بدتر می کند. لباس های گرم بپوشید و از کشیدن سیگار خودداری کنید.
- به پزشک خود بلافاصله در صورت تجربه ی هر کدام از این عوارض ناخوشایند ولی جدی گزارش دهید: تورم مچ پا، خستگی و ضعف شدید، تنگی نفس و افزایش ناگهانی وزن، خارش شدید، تورم مخصوصاً در صورت، زبان و گلو، سرگیجه شدید و یا مشکل تنفسی، درد قفسه سینه،

تنگی نفس، فشار خون، درد قفسه سینه منتشر به فک و گردن و دست، تعریق غیرعادی، مشکل تنفسی و ضربان قلب تند و نامنظم.

- مصرف دارو را بدون مشورت با پزشک قطع نکنید. بعضی از شرایط بیماری شما ممکن است با متوقف کردن این دارو بدتر شود.
- زمانیکه به تدریج مصرف این دارو را متوقف می کنید، به شما توصیه می شود که به طور موقت فعالیت های فیزیکی را محدود کنید تا فشار وارد بر قلب شما کاهش یابد.
- این دارو در صورت اینکه شما دارای شرایط خاص پزشکی باشید نباید مورد استفاده قرار گیرد. این شرایط شامل: انواع خاصی از مشکلات ریتمی قلب می باشد.
- قرص کونکور ممکن است باعث ایجاد احساس تپش قلب و افزایش ضربان قلب شود.
- اگر دیابت دارید، قرص کونکور می تواند کنترل قند خون را سخت تر کند چون هم باعث افزایش قند خون می شود که علائم آن تشنگی و افزایش ادرار می باشد و هم باعث می شود علائم کاهش قند خون مثل سرگیجه و تعریق خود را نشان ندهند بنابراین قند خون خود را مرتب چک کنید.