نام ژنریک: دیگوکسین

نام تجاری: لانوکسین

مکانیسم دارو : افزایش دهنده قدرت انقباضی قلب / کاهش ضربان قلب

دیگوکسین

- **این دارو طبق دستور پزشک مصرف شود.**
- **قبل از مصرف دارو نبض خود را در یک دقیقه بشمارید، در صورت کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه یا بیش از ۱۱۰ ضربه در دقیقه به پزشک خود اطلاع دهید.**
- **تحت هیچ عنوان مقدار دارو افزایش یا حذف نگردد.**
- **در یک زمان در طول روز مصرف شود.**
- **د صورت مصرف داروی دیگری آن را به پزشک خود اطلاع دهید.**
- **در صورت مراجعه به دندانپزشک یا قبل از انجام جراحی پزشک معالج خود را در جریان بگذارید.**
- **در صورت داشتن علائم زیر به پزشک خود اطلاع دهید: بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکم، ضربان قلب نامنظم،غش، تنگی نفس، خارش، کاهش قدرت بینایی، اختلال در هوشیاری و دیدن حاله آبی اطراف اشیا.**
- **بهتر است دارو با معده خالی مصرف شود اما در صورت عوارض گوارشی می‌توان همراه غذا یا شیر مصرف نمود.**

- **بهتر است از یک نمونه دارو استفاده شود.**
- **غذاهای سرشار از پتاسیم مثل موز، زردآلو، پرتغال، کیوی و سیب زمینی مصرف نمایید.**
- **این دارو همزمان با داروهای ضد اسید معده مصرف نشود.**
- **از قطع ناگهانی دارو بپرهیزید.**