چه وقت فرزندتان را به نزد پزشک ببرید؟

اگر یکی از علائم زیر مشاهده شد:

- ✓ کم شیر خوردن یا عدم شیر خوردن
- ✓ دا شتن تب
- ✓ ز جر تنفسی (تلاش تنفسی) یا تنفس غیرعادی
- ✓ تغییر رنگ پوست (رنگ پریده یا کبود)
- ✓ خواب آلودگی
- ✓ تغییر در تن صدای نوزاد و یا گریه های جیغ مانند و بیش از حد
- ✓ تغییر در تن عضلانی، سفتی یا شلی خاص
- ✓ کا هش یا افزایش ضربان قلب نسبت به حد طبیعی
- ✓ تو رم یا برجستگی ملاجها
- ✓ هر گونه تغییر رفتار یا حرکاتی که شما را نگران کند.
- ✓ کا هش دمای بدن
- ✓ تغییرات رنگ پوست
- ✓ ناله کردن



عفونت خونی نوزاد چه عوارضی دارد؟

اگر عفونت درمان نشود گسترش می یابد و منجربه بروز عوارض بسیار شدیدی می شود.عفونت می تواند بر عملکرد اعضای مختلف بدن تأثیر گذاشته و منجر به نارسایی کلیه، بیماری های ریه و صدمات مغزی شود. اگر عفونت به سرعت درمان نشود یا اصلاً درمان نشود، ممکن است عواقب وخیمی داشته باشد



آیا عفونت خونی قابل پیشگیری است؟

اگرچه تمامی انواع عفونت ها قابل پیشگیری نیستند؛ اما از بعضی از آن ها می توان اجتناب نمود. زنان باردار باید از نظر وجود هرگونه عفونت در کانال زایمانی مورد ارزیابی قرارگیرند و اگر قطعی شد، درمان شوند. حتی اگرخانم بارداری از نظر عفونت چک نشده باشد؛ امادر گروه پرخطر باشد (مثلاً تب حین زایمان،پارگی زودرس کیسه آب، زایمان طول کشیده،سابقه زایمان نوزاد مبتلا به عفونت) به منظورکاهش خطر انتقال عفونت در طی زایمان باید درمان شود.

عفونت خونی نوزادی چگونه تشخیص داده شده و درمان می شود؟

*تست های آزمایشگاهی شامل آزمایش خون وکشت خون و آزمایش ادرار است که باید حتماً به طریقه صحیح واستریل، نمونه گیری انجام شود.

**کشیدن مایع نخاعی (مایع کمری) بر اساس وضعیت کودک

***عکسبرداری به خصوص ازقفسه سینه می باشد.

وجود عفونت خونی و یا حتی شک به آن درنوزادان و شیرخواران کوچک مستلزم مراقبتهای ویژه و انجام اقدامات درمانی بیمارستانی میباشد تا آنتی بیوتیک ها از طریق رگ تزریق شوند.

معمولاً قبل از اینکه تشخیص قطعی شود، پزشکان تجویز آنتی بیوتیک را شروع می کنند؛ زیرا تا انجام آزمایشات کامل و نتیجه آنها دو تا سه روززمان لازم است. لذا عدم شروع درمان و منتظر ماندن برای جواب می تواند منجر به منتشر شدن عفونت در بدن و بروز عواقب وخیمی گردد.



توجه: مادر گرامی لطفاً در حین بستری،دست های خود را مرتباً بشویید.

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مسلمین

عفونت خون در نوزادان



شناسنامه بروشور آموزشی	
عنوان	سپسیس در نوزادان
تهیه کننده	زمانه پوزش کارشناس پرستاری
سمت	سوپروایزر آموزشی
منبع	نلسون نوزادان ۲۰۲۲
تاییدکننده	دکتر مریم جمالی شیرازی(مسئول علمی نوزادان)
سال تهیه	بهار۱۴۰۱

عفونت خونی نوزادی (سپسیس نوزادی) چیست؟

عفونت خونی یک حالت کاملاً جدی به حساب میآید که نام دیگر آن مسمومیت خونی یا وجودباکتری در خون است.

علل عفونت خونی چیست؟

این علتها به دو دسته تقسیم میشوند:

عفونت اولیه: که در هفته اول تولد و بیشتر در۲۴ ساعت اول تولد مشاهده می شود . این نوع عفونت بیشتر از مادر به توزاد منتقل می شود.

علل :

- باکتری یا عفونت حاصل از مادر در طول
- بارداری
- زایمان زود رس
- پاره شدن کیسه آب که بیش از ۲۴ ساعت
- طول کشیده باشد
- عفونت جفت
- عفونت مایع آمینوتیک
- عفونت واژینال

عفونت ثانویه: این نوع عفونت اغلب در هفته دوم تولد و بیشتردر نوزادان نارس ایجاد می شود.

علل:

- تجهیزات آلوده بیمارستان
- تزریقات داخل رگی به مدت طولانی
- گرفتن داروهای متعدد که منجر به مقاومت

بدن نسبت به داروها می شود.

- بستری طولانی مدت در بیمارستان

نکته:

در توزادان نارس بدلیل ضعیف بودن و رشدناکافی سیستم دفاعی ، بدن قادر به مقابله باباکتریهای وسیعی که در معرض آنها قرار می گیردنیست و بیشتر مستعد عفونت می باشد

عفونت خونی نوزادی چه علائمی دارد؟

بعضی از شایع ترین علائم عفونت در نوزادان شامل:

- کاهش میل به شیر خوردن
- تب
- ناآرامی و بدخلقی
- ضعف و بی حالی
- شلی
- تغییر در ضربان قلب که یا بسیار تندتر از حدطبیعی و یا خیلی کندتر از آن می شود.
- تنفس سریع یا اشکال تنفسی
- وجود دوره هایی که به نظر می رسد توزاد نفس نمی کشد
- زردی

