نام ژنریک: فنی توئین

نام تجاری : دیلانتین

مکانیسم دارو : کنترل حملات صرع

فنی توئین

- جهت پیشگیری از تورم و خونریزی لثه ها،بهداشت دهان و دندان را رعایت کرده و مرتب ویزیت دندانپزشکی انجام شود.
- رنگ ادرار ممکن است، قرمز، صورتی یا قهوه‌ای مایل به قرمز شود.
- در صورت وقوع تب، زخم در گلو، واکنش‌های پوستی، خستگی، خشکی پوست، بم شدن صدا و حرکات غیر قابل چشم و بدن و اختلال در نتایج فعالیت کبدی به پزشک مراجعه کنید.
- از قطع ناگهانی دارو در پی مصرف طولانی مدت پرهیز شود. چون ممکن است احتمال تشنج را بالا ببرد.
- از مصرف الکل پرهیز شود.
- جهت کاهش تحریکات گوارشی، دارو با غذا یا شیر مصرف شود.
- از آنجایی که این دارو با دیگر داروها تداخل داشته قبل از مصرف هر داروی دیگر با پزشک مشورت نمایید.
- در صورت مصرف همزمان دارو با داروهای پیشگیری کننده بارداری، اثر داروی ضد بارداری تغییر می‌یابد،لذا بهتر است از روش دیگری جهت جلوگیری از بارداری استفاده شود.
- این دارو می‌تواند قند خون را افزایش یا کاهش دهد.
- بیماران تحت درمان طولانی مدت باید مصرف کافی غذاهای حاوی ویتامین D و تماس با نور آفتاب کافی داشته باشند.