نام ژنریک : لووفلوکساسین

نام تجاری : تاوانکس

مکانیسم دارو: آنتی بیوتیک

لووفلوکساسین

- در افراد زیر ۱۸ سال به دلیل عارضه پارگی تاندون،آشیل و اختلال در اعصاب مرکزی منع مصرف دارد.
- این دارو برای افرادی که دچار نوعی از بی‌نظمی ریتم قلب هستند و یا سطح پتاسیم خون آنها پایین است منع مصرف دارد.
- درصورت بروز اولین نشانه واکنشهای حساسیتی و یا راش پوستی، مصرف دارو باید قطع گردد.
- در صورت بروز تشنج،مصرف دارو باید قطع گردد.
- این دارو در افراد بالای ۶۰ سال با احتیاط فراوان باید مصرف شود.
- افرادی که ناراحتی گوارشی دارند بهتر است این دارو را همراه غذا یا مایعات فراوان مصرف کنند.
- مصرف مداوم و مکرر این دارو ممکن است شما را مستعد عفونتهای قارچی دهان و همچنین برفک دهان نماید. در صورت مشاهده هر گونه ناحیه سفیدرنگ و یا غیر طبیعی در دهان خود به پزشک مراجعه کنید
- در صورتی که شما سابقه حساسیت دارویی به این دارو یا داروهای مشابه سیپروفلوکساسین دارید بایستی قبل از مصرف این دارو پزشک خود را مطلع نمایید.

- در صورتی که این دارو بر روی بینایی شما اثر می‌گذارد ویا موجب خواب آلودگی شما می‌شود، از رانندگی پرهیز نمایید و از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید.
- در حین مصرف دارو از مصرف الکل بپرهیزید
- اگر یک نوبت را فراموش کردید به مجردی که به یاد آوردید، مصرف کنید. البته اگر تقریبا موقع نوبت بعدی رسیده است، نوبت فراموش شده را رها و به برنامه منظم دارویی‌تان برگردید. مقدار دارو را دوبرابر نکنید.
- مصرف این دارو در بارداری توصیه نمی‌شود. بنابراین در صورتی که شما حین استفاده از این داروباردار شده اید یا قصد بارداری دارید موضوع را با پزشک خود در میان بگذارید و با وی درباره مصرف این دارو مشورت نمایید.
- این دارو می‌تواند از طریق شیر مادر به نوزاد یا شیرخوار منتقل شود. بنابراین در دوران شیردهی با احتیاط مصرف شود.
- در صورت ایجاد واکنش‌های آلرژیک دارو باید بلافاصله قطع شود و به پزشک ود اطلاع دهید.