نام ژنریک : پردنیزولون

نام تجاری : نیزوپرد

مکانیسم دارو : کورتون / ضدالتهاب

پردنیزولون

- از تغییر مقدار مصرفی دارو پرهیز شود.
- در صورت مشاهده تب، زخم گلو، درد عضلات، افزایش ناگهانی وزن، درد شدید شکمی و مدفوع سیاه رنگ به پزشک اطلاع دهید.
- مصرف غذاهای حاوی قند بالا و شور را محدود کرده و از غذاهای حاوی پتاسیم بالا مثل سیب زمینی، موز، پرتغال، نان و غلات، حبوبات و سبزیجات استفاده شود.
- بهداشت فردی را رعایت کرده و از تماس با افراد بیمار عفونی بپرهیزید.
- بدون مشورت با پزشک از انجام هر گونه واکسیناسیون بپرهیزید.
- در صورت مصرف قرص های ضد بارداری پزشک خود را در جریان بگذارید.
- از انجام کارهای مستلزم هوشیاری کامل یا مهارتهای حرکتی پرهیز شود.
- ممکن است واکنس های حساسیتی به نور روی دهد از این رو توصیه می شود از مواجهه طولانی مدت با نور خورشید پرهیز شود.
- بهتر است دارو با غذا یا شیر مصرف شود.
- خشکی دهان و خواب آلودگی و سرگیجه از عوارض دارو می باشد.
- به منظور کاهش عوارض، مصرف مایعات را افزایش دهید.